

男性激素软膏

第一类医药品

# 谷勒明®

男性激素制剂

使用前请阅读本说明书并保管好,以便需要时查阅。

“谷勒明”是以男性激素中的睾酮作为有效成分而配制的药品。

男性睾酮分泌量从第二性征期(青春期)起急剧上升,直到30岁左右都很旺盛,其后随年龄增加而减弱,从40岁后半段起显著减少。由此多发性机能衰退的各种症状,如男性更年期和老年前期的抑郁等。另外,除老化外,也有因心理压力等原因引起的睾酮分泌量急剧降低。“谷勒明”软膏通过皮肤对男性激素分泌不足给予补充,从而改善因分泌不足引起的各种症状。



## 注意事项

### 禁止事项

(不能遵守以下事宜,会使目前症状恶化,或易产生副作用)

- 有以下情况者不能使用
  - 对本药剂或本药剂中成份有过敏史者。
  - 使用前,挤出约5毫米药剂,擦涂于大腿内侧皮肤浅薄处,翌日出现药疹、发红、瘙痒、发疹、红肿者。
  - 患有或怀疑患有男性激素依存性肿瘤(例如前列腺肿瘤,乳腺肿(恶性))者。
  - 排尿困难的前列腺肥大患者。
  - 前列腺检查结果,前列腺特异抗原(PSA)值为2.0ng/ml以上者(遵从医师诊断)。
    - ※本制剂的有效成分睾酮可能助长前列腺肿瘤。
      - 特别对50岁以上男性,因罹患前列腺肿瘤比率较高,使用本药剂前务必接受前列腺检查。
      - 长期使用者务必定期接受检查。
      - 检查结果有异常者,立即停用本药剂,向医师或药剂师咨询。
  - 睡眠呼吸暂停综合症
  - 孕妇或可能妊娠的女性、哺乳期妇女。
- 以下部位不能使用
  - 眼及眼部周围、粘膜(口腔、鼻孔等)。
  - 阴茎前端(尿道口)。
  - 外伤、炎症、湿疹、溃烂、化脓等部位。
- 使用本制剂时,不能使用以下药品
 

苯丙酮香豆素钾等抗凝血药物。
- 除本人使用外,不要黏附于他人
  - 使用后用肥皂和温水将手充分洗净。
  - 除本人使用外,请注意不要黏附于他人。如有附着立即用水冲洗。
  - 涂抹部位可能与他人发生触碰的,请将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。



### 征求咨询

- 有以下情况者,使用前务必向医师或药剂师咨询。
  - 接受医师治疗者。
  - 前列腺肥大,但排尿不困难者。
  - 对药品等有过敏(发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水泡等)史者。
  - 被诊断为以下症状者。
 

严重的心脏病、肾脏病、肝病、高血压、多血症。
  - 婴幼儿、儿童(可能造成骨骺早熟闭合、性早熟)。
  - 使用以下药品者
 

其他男性激素药、5 $\alpha$ 还原酶抑制剂
- 有以下情况者,应立即停止使用并持本说明书向医师或药剂师咨询
  - 使用后,出现以下症状者。

相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水泡、脓疱、脱毛、多毛、皮肤变色
其他	血压上升、尿频

- 使用一个月前后而症状无改善者。
- 月经异常、出现变声等男性化征兆者。
- 睾丸萎缩、精子精液减少者。
- 有男乳女性化征兆者。
- 未按规定使用药剂者。

## ■ 功能 主治 ■

男性激素分泌不足引发的性神经衰弱症状，即勃起力减弱、早泄、阳痿、性欲缺乏、性兴趣减退感、遗精、无睾症、原发性小睾症。垂体促性腺激素分泌和作用障碍造成的隐睾症。女性外阴部无毛症、抑制乳汁分泌。

### 【用语说明】

[勃起力减弱] 指勃起机能衰弱

[阳痿] 指阴茎扩张和勃起低下。

[遗精] 指没有充分勃起时射精。

[隐睾症] 指两侧的睾丸留在腹腔中。

## ■ 用法 用量 ■

以适当药量用于局部涂抹

### 【注意】

(1) 务必严守规定的用法和用量。

(2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，务须接受眼科医生诊疗。


(3) 使用前，请将手指清洗干净。

(4) 将涂抹部位清洁后使用。

(5) 仅限于外用。

## ■ 详细用法 ■

	男性	女性
从软管挤到手指的长度	2 厘米/次 (参照右图)	0.3 厘米/次 (参照右图)
用法	二次/日 (早、晚) 症状改善后一次/日	一次/日
涂敷部位	阴囊、下颌或腹部等处	患处
	要充分擦入皮肤	不要涂敷于阴道粘膜



## ■ 成 份 ■

每 1 克当中含有以下有效成份

有效成份	1 克当中	内容
睾 酮	10 毫克	男性激素

添加物中含有白凡士林、硬脂醇、丙二醇、乙氧基化氢化蓖麻油 60、单硬脂酸甘油酯、羟苯甲酯、羟苯丙酯。

## ■ 贮藏注意事项 ■

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿使用过期制品。
5. 过多挤出本药剂时，不要收回到软管。

— 联系方式 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 0120-246-717

接待时间 9:00~12:00、13:00~17:00

(节假日及本公司停业日除外)

制药销售单位



大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里624 番地2-207

请续读背面。