

2014年12月改订(因记载方式更改而改订)

男性激素软膏

第一类医药

托诺斯® 男性激素制剂

使用前请阅读本说明书并保管好,以便需要时查阅。

“托诺斯”是以局部麻醉剂(氨基苯甲酸乙酯、盐酸普鲁卡因、盐酸地布卡因)和男性激素中的睾酮作为有效成分而配制的药品。

将本制剂擦入龟头冠部,在局部麻醉剂作用下,有减缓射精的效果。男性激素是促成“男子汉气概”的物质,通过擦入皮肤柔软部位(如阴囊部位)被人体吸收,进而改善因老化,激素分泌不足而引起的精力减退、勃起力减弱、遗精、男子更年期障碍。



注意事项

禁用事项

(不能遵守以下事宜,会使目前症状恶化,或易发生副作用)

- 有以下情况者不能使用
 - 对本药剂或本药剂中成分有过敏症史者。
 - 使用前,从软管挤出5毫米药剂,擦涂于大腿内侧皮肤浅薄处,翌日有药疹,发红,瘙痒,发疹,红肿者。
 - 患有或怀疑患有男性激素依存性肿瘤(例如前列腺肿瘤,乳腺肿(恶性))者。
 - 排尿困难的前列腺肥大患者。
 - 前列腺检查结果,前列腺特异抗原(PSA)值为2.0ng/mL以上者(遵从医师判断)。

※本制剂的有效成分睾酮可能助长前列腺肿瘤。

 - 特别对50岁以上男性,因罹患前列腺肿瘤比率较高,使用本药剂前需接受前列腺检查。
 - 长期使用须定期接受检查。
 - 检查结果异常者,立即停用本药剂,向医师或药剂师咨询。
 - 睡眠呼吸暂停综合征者
 - 女性。
 - 小儿(未满15岁)
- 以下部位不能使用
 - 眼及眼部周围、粘膜(口腔、鼻孔等)。
 - 阴茎前端(尿道口)。
 - 外伤、炎症、湿疹、溃烂、化脓等部位。
- 使用本制剂时,不能使用以下药品

苯丙酮香豆素钾等抗凝药物。
- 除本人使用外,不要黏附于他人
 - 使用后用肥皂和温水将手洗净。
 - 注意除本人使用外,不要黏附于他人。如有附着立即水洗。
 - 涂抹部位可能与他人触碰的,将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。



征求咨询

- 有以下情况者,使用前向医师或药剂师咨询。
 - 接受医师治疗者。
 - 前列腺肥大,但排尿不困难者。
 - 对药品等有过敏症(发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱等)史者。
 - 被诊断为以下症状者。

严重的心脏病、肾病、肝病、高血压、多血症。
 - 使用以下药品者

其他男性激素药、5 α 还原酶抑制剂
- 有以下情况者,应立即停止使用并持本说明书向医师或药剂师咨询
 - 使用后,出现以下症状的。

相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱、脓疱、脱毛、多毛、皮肤变色
其他	血压上升、尿频

- 使用一个月左右症状无改善者。
- 出现睾丸萎缩、精子精液减少等症状者。
- 出现男乳女化征兆者。
- 未按规定使用药剂者。

请续读背面。

■ 功能主治 ■

男性更年期障碍、男性性神经衰弱症状（早泄、勃起力减弱、性功能障碍、精力衰退、遗精、无睾症、梦精等）。

【用语解说】

〔男性更年期障碍〕指因男性激素减少引起的各种症状。

〔男性性神经衰弱症状〕其中的“勃起力减弱”即勃起机能衰退；“性功能障碍”指男性生殖器的机能障碍；“遗精”指没有充分勃起而射精。

■ 用法用量 ■

男子更年期障碍，需在患处或皮肤柔软处以每日一次0.1克（小豆大小）充分擦涂，症状好转后改为隔日或每周2次使用。


男性性神经衰弱症状（早泄、勃起力减弱等）需直接涂擦于性器处。

〔注意〕

- (1) 严守规定的用法和用量。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，须接受眼科医生诊疗。
- (3) 使用前，请将手指洗净。
- (4) 将涂抹部位清洁后使用。
- (5) 仅限于外用。

■ 详细用法（建议参照） ■

	延迟早泄等射精时间	改善勃起力减弱、精力减退等症状
从软管挤出手指的长度	5毫米/次（参照右图）	
用法	性交前20~30分钟擦涂	1日1次
涂敷部位	龟头部（龟头冠）	阴囊部（睾丸）
注意事项	涂抹时要充分擦入皮肤。感到麻痺时用肥皂等清洗掉。尽量少量使用（少有发生因疗效过强而造成勃起力低下的情况。）	涂抹时所有部位都要充分擦入皮肤。如有改善，涂抹次数应减少为隔日或每周2次程度。



■ 成份 ■

1g当中含以下有效成份

有效成份	1克当中	内容
睾酮	10毫克	男性激素
氨基苯甲酸乙酯	100毫克	局部麻醉剂
盐酸普鲁卡因	5毫克	局部麻醉剂
盐酸地布卡因	10毫克	局部麻醉剂
盐酸苯海拉明	5毫克	抗组胺剂

添加物中含有白凡士林。

■ 贮藏注意事项 ■

1. 避开直射日光，置于冰箱等阴凉干燥处（15℃以下）密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿使用过期制品。
5. 过多挤出本药剂时，不要收回到软管。


— 联系方式 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 **0120-246-717**

接待时间 9:00~12:00、13:00~17:00

（节假日及本公司停业日除外）

制药销售单位  大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里624番地2-207

请续读背面。