

男性激素乳膏剂

第一类医药品

使用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

固酪敏®

男性激素制剂

本制剂是以男性激素中的睾酮作为有效成分而配制的药品。

男性睾酮分泌量从第二性征期（青春期）起急剧上升，直到 30 岁前后都很旺盛，其后随年龄增加而减弱，从 40 岁后半段起显著减少。由此多发性机能衰退的各种症状，如男性更年期和老年前期的抑郁等。另外，除老化外，也有因心理压力等原因引起睾酮分泌量急剧降低。本制剂通过皮肤对男性激素分泌不足给予补充，从而改善因分泌不足引起的各种症状。



注意事项



禁止事项

（不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易产生副作用）

- 有以下情况者请勿使用。
 - 对本药剂成份有过敏史者。
 - 使用前，挤出约 5 毫米药剂，擦涂于大腿内侧皮肤浅薄处，翌日出现药疹、发红、瘙痒、皮疹、红肿者。
 - 患有或怀疑患有男性激素依存性肿瘤（例如前列腺肿瘤，乳腺肿（恶性））者。
 - 孕妇或可能妊娠的女性、哺乳期妇女。
 - 儿童（应遵从医师判断）。
 - 排尿困难的前列腺肥大患者。
 - 前列腺检查*结果，前列腺特异抗原（PSA）值为 2.0ng/mL 以上者（应遵从医师诊断）。

※本制剂的有效成分睾酮可能助长前列腺肿瘤。

 - 特别对 50 岁以上男性，因罹患前列腺肿瘤比率较高，使用本制剂前务必接受前列腺检查。
 - 长期使用者务必定期接受检查。
 - 检查结果有异常者，应立即停用本药剂，向医师或药师咨询。
 - 睡眠呼吸暂停综合症者
- 以下部位请勿使用
 - 眼及眼部周围、粘膜（口腔、鼻孔等）。
 - 阴茎前端（尿道口）。
 - 外伤、炎症、湿疹、溃烂、化脓等部位。
- 使用本制剂期间，请勿使用以下药品。

含有男性激素的医药品。
- 除本人使用外，不要黏附于他人
 - 使用后用肥皂和温水将手充分洗净。
 - 除本人使用外，请注意不要黏附于他人。如有附着应立即用水冲洗。
 - 涂抹部位可能与他人发生触碰的，应将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。



征求咨询

- 有以下情况者，使用前务必向医师或药师咨询。
 - 接受医师治疗者。
 - 前列腺肥大，但无排尿困难者。
 - 对药品及化妆品等有过敏（发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱等）史者。
 - 本人或家族为过敏体质者。
 - 严重的心脏病、肾脏病、肝病、高血压患者或有既往病史者。
- 使用后，出现以下症状者，可能发生副作用，应立即停止使用，并持本说明书向医师或药师咨询。

相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱、脓疱

- 使用一个月前后而症状无改善者，应持本说明书向医师或药师咨询。
- 月经异常、或出现变声等男性化征兆者，应立即停止使用，并持本说明书向医师或药师咨询。
- 未按规定使用药剂者，应立即停止使用，并持本说明书向医师或药师咨询。

■ 功能 主治 ■

男性激素分泌不足引发的性神经衰弱症状，即勃起力减弱、早泄、阳痿、性欲缺乏、性兴趣减退感、遗精、无睾症、原发性小睾症。垂体促性腺激素分泌和作用障碍造成的隐睾症。女性外阴部无毛症、抑制乳汁分泌。

【用语说明】

[勃起力减弱] 指勃起机能衰弱

[阳痿] 指阴茎扩张和勃起低下。

[遗精] 指没有充分勃起时射精。

[隐睾症] 指两侧的睾丸留在腹腔中。

■ 用法 用量 ■


以适当药量用于局部涂抹

[注意]

- (1) 务必严守规定的用法和用量。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，务须接受眼科医生诊疗。
- (3) 使用前，请将手指清洗干净。
- (4) 将涂抹部位清洁后使用。
- (5) 仅限于外用。

■ 详细用法 (推荐) ■

	男性	女性
从软管挤到手指的长度	2 厘米/次 (参照右图)	0.3 厘米/次 (参照右图)
用法	二次/日 (早、晚) 症状改善后一次/日	一次/日
涂敷部位	阴囊、下颌或腹部等处	患处
	要充分擦入皮肤	不要涂敷于阴道粘膜



■ 成 份 ■

100 克当中含有以下有效成份

有效成份	100 克当中	内容
睾 酮	1 克	男性激素

添加物中含有白凡士林、硬脂醇、丙二醇、乙氧基化氢化蓖麻油 60、单硬脂酸甘油酯、羟苯甲酯、羟苯丙酯。

■ 贮藏注意事项 ■

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿使用过期制品。
5. 过多挤出本药剂时，不要收回到软管。

■ 其 他 ■

本制剂因记载法定说明所需，使用大于内容量的容器。因而，容器内留有间隙。为维护品质封装氮气充填并对内容量严格管理。

— 联系方式 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 0120-246-717

接待时间 10:00~12:00、13:00~16:00

(周六、周日、法定节假日及本公司停业日除外)

制药销售单位



大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里 624 番地 2 (ALIA207)

请续读背面。