

女性激素软膏剂

第②类医药品

希莫勒斯® 卵泡激素制剂

使用前请阅读本说明书并妥善保管，以便需要时查阅。

本制剂是以雌二醇（天然型卵泡激素）和炔雌醇（合成卵泡激素）配制而成的医药品。卵泡激素是女性激素的一种，也称为雌激素，主要由卵巢分泌，以所谓的“女性气质”和“阴道润滑”等多种作用而广为人知。

伴随卵巢障碍及老化或心理压力而至的卵巢机能衰退，会使卵泡激素分泌减少，从而引发多种症状。例如，更年期的女性，因卵泡激素分泌的急剧减少，会出现烦躁、潮热、发汗、性功能低下等各种症状。这些不明原因临床主诉被称作更年期障碍。同时，因绝经后卵泡激素不再分泌，阴部失去滋润而萎缩，产生不适感和痛感以致降低生活品质。

本制剂可经易于吸收的局部黏膜补充卵泡激素，以填补卵泡激素的不足，是低刺激性软膏剂。



使用注意事项

禁止事项

（不能遵守以下事宜，可能会使目前症状恶化，或易产生副作用）

1. 以下人群请勿使用。

*（1）对本制剂或本制剂成份有过敏症史者

*（2）在使用前，先从软管中挤出本制剂约3毫米，用1~2滴水或热水充分混合，然后擦涂于大腿内侧等皮肤纤薄处，翌日出现药疹、发红、瘙痒、肿胀等症状者

*（3）血栓症、子宫内膜异位症、脑中风、心脏病、肾病患者或既往病史者

*（4）乳房或子宫、卵巢处罹患肿瘤者及有可能罹患患者〔本制剂的有效成份对乳房和子宫恶性肿瘤患者，可能会加快病情进展〕

（5）家族成员或本人有恶性肿瘤病史者

*（6）子宫肌瘤、糖尿病、高血压、癫痫、肝功能障碍者

（7）生理期、非正常阴道出血、有阴道分泌物（白带）者

（8）孕妇或有可能妊娠的女性、哺乳期妇女

（9）儿童

2. 以下部位请勿使用。

（1）眼睛及眼部周围

*（2）外伤、湿疹、溃烂、炎症及严重化脓的患处。

* 3. 使用本制剂期间，请勿使用以下任何医药品。

含有相同成份的其他医药品

* 4. 使用本制剂期间，请勿摄入以下任何食品。

含圣约翰草（St. John's Wort）的食品、依普黄酮

5. 除使用者外，不要使本制剂黏附于他人

（1）使用后用肥皂和温水将手充分洗净。

（2）除使用者外，注意不要黏附于他人。如有附着应立即用水冲洗。

（3）涂抹部位可能与他人发生触碰时，应将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。

6. 请勿用于避孕目的。

（1）有避孕愿望者，强烈建议采取适当措施。

（2）使用本制剂可能引起月经周期变化，务须避开奥克二氏避孕法等应用月经周期和基础体温的避孕方法。



征求咨询

1. 下述人群，使用前务必向医师、药剂师或注册经销商咨询。

（1）接受医师治疗者

（2）对药品等有过敏（发疹、发红、发痒、皮疹、肿胀等）史者

2. 使用后，出现以下症状者，可能发生副作用，应立即停止使用并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

相关部位	症状	相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、肿胀	消化器官	恶心、呕吐、食欲不振
乳房	疼痛、胀满	其他	头痛、浮肿、眩晕

* 3. 生理周期及经血状态明显反常者，应立即停止使用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

4. 使用两周左右而症状无改善者，应持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

* 5. 使用方法失当时，应立即停止使用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

其他注意事

初次使用本制剂前，建议作乳房和子宫的医学检查。使用开始后，请作乳房和子宫的定期检查。

■ 功能 功效 ■

适应症 性唤起障碍、性欲冷淡、不孕症、妇女更年期障碍、妇女神经衰弱

【用语解说】**妇女更年期障碍**：因年龄增长或心理压力，引起卵巢机能衰退，使女性激素分泌减少，从而发生各种各样的自律神经失调症状（潮红、潮热、发冷、烦躁等）。

妇女神经衰弱：因承受巨大的精神压力、持续偏食、过度节食等使激素分泌失调而引发的症状。

■ 用法 用量 ■


成人用量 使用时用手指取本制剂 0.5 克（黄豆大小），同少许水份或唾液混合后，涂抹于女性部位的粘膜处。以此用量一日使用 1~2 次。

【关于用法用量的注意事项】

- (1) 务必严守规定的用法和用量。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，务须接受眼科医生诊疗。
- (3) 使用前，请将手指清洗干净。
- (4) 将涂抹部位清洁后使用。
- (5) 仅限于外用。

■ 详细用法 ■

- 一日一次（洗浴后就寝前）或二次（早、晚），从软管中取本制剂取 3~7 毫米左右于手指上（参照下图），用 1~2 滴水或热水充分混合，然后涂抹于女性部位的粘膜（阴道内）处。
- 对本制剂所需用量因人而异，最初从一日 3 毫米左右起试用，适当增量。每日最大用量不超过 0.5 克（即最大用量为一次约 12 毫米，一日二次）。
- 月经结束后，使用两周。之后，应待下次月经结束前停用。
- 已绝经者或因月经不调而长期停经者（妊娠中不可使用）可即刻使用。使用两周后，应停用两周以上。
- 已改善的症状复发时，可按同样的方法再次使用。



■ 成份 含量 ■


100 克中含有以下有效成份

有效成份	100 克当中	内容
炔雌醇	0.02 克	合成卵泡激素
雌二醇	0.06 克	卵泡激素

添加物中含有白糖、精制羊毛脂、白凡士林。

■ 保存及操作注意事项

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 请勿换装于其他容器（易引发误用或变质）。
4. 请勿使用过期制品。
- *5. 请勿将附着本制剂的手触摸眼睛及粘膜（阴道内除外）
6. 过量挤出的本制剂，不要重新收回到软管。
7. 为避免变色及产生污垢，使用后，请检查本制剂是否附着于软管螺纹处及盖子螺纹处，如有附着，请擦拭干净后把盖子拧紧。（参照右图）



■ 其 他 ■

本制剂因记载法定说明所需，使用大于内容量的容器。因而，容器内留有间隙。为维护品质封装氮气充填并对内容量严格管理。

— 联系方式 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 0120-246-717

接待时间 10:00~12:00、13:00~16:00
(周六、周日、法定节假日及本公司停业日除外)

制药销售单位



大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里 624 番地 2 (ALIA207)