

奇应热 儿童解热栓剂

第二类医药品

儿童正常体温高于成年人，稍许发热也会保持活跃。而当发高烧（一般为 38 ° C 以上）时，会消耗体力甚至出现发热性惊厥，因而务须确保退烧。

奇应热药剂成分直接通过肠道吸取，不伤胃，效力快，可有效解热。



使用时的注意事项

本药剂为幼儿用药，但解热药所规定的一般性注意事项都有记述。



禁忌事项

(不遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易发生副作用及事故)

- 以下情况者禁用。**
 - 对本药剂或本药剂成份有过敏史者。
 - 曾因使用本药剂或其他解热镇痛药剂、感冒药而引发哮喘者。
- 使用本药剂期间，禁用下列任一种医药品。**
其他解热镇痛药剂、感冒药、镇静剂
- 使用前后可不可饮酒。**
- 不可长期连续使用。**



咨询事宜

- 以下情况者使用前，须向医师、牙科医师、药剂师或注册经销商咨询。**
 - 正接受医师或牙科医师治疗者。
 - 妊娠或可能妊娠者。
 - 高龄者。
 - 对药品等有过敏史者。
 - 确诊为下列疾患者。
心脏病、肾脏病、肝脏病、胃十二指肠溃疡
- 服用后，如出现以下症状，可能为副作用，应即刻停止使用，并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。**

相关部位	症状	相关部位	症状
皮肤	发疹・发红，发痒	精神神经系统	眩晕
消化器官	恶心・呕吐、食欲不振	其他	体温过低

偶有发生下记危重病征者，应立即接受医师诊治。

症状名	症状
过敏性休克	使用后即刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、嗓音嘶哑、喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状
皮肤黏膜眼综合症(史蒂文斯-约翰逊综合症), 中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病	高烧、眼睛充血，眼眵、嘴唇发炎、喉咙疼痛、皮肤大范围发疹、发红、皮肤泛红处出现小脓包，全身倦怠、食欲不振等症状持续、或急剧恶化。
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸(皮肤及眼白变黄)、棕褐色尿、全身倦怠、食欲不振等症状。
间质性肺炎	上楼梯或轻微用力即会喘息、胸闷、干咳、发热等症状突发，或持续发生。
哮喘	表现出呼吸时有哮鸣音，呼吸费力等。
肾功能不全	出现尿量减少、发热、发疹、全身浮肿、全身倦怠、关节疼痛、腹泻等。

- 使用一次后，症状仍无改善者，应停止使用，并持本说明书向医师、牙科医师、药剂师或注册经销商咨询。**

(请务必阅读背面。)

成份及含量

1 个 (950 毫克) 当中

对乙酰氨基酚.....100 毫克

添加物含硬化脂肪

功能及主治

儿童发热时一时解热用



夜间等忽然
发热时用



不便经口饮用时
(易吐、不思进
食、咳嗽严重等)
用

用法及用量


将以下用量插入肛门内。

年龄	1 岁未 满	1~2 岁	3~5 岁	6~12 岁
一次 用量	禁用	1/2~1 个	1 个	1~2 个
使用 次数		1 日 1 次		

注意

- (1) 应在监护人指导监督下使用。
- (2) 务必严守规定的用法和用量。
- (3) 不可用于未满 1 岁的婴儿。
- (4) 用药限定 1 日 1 次，不可连续二日使用。
- (5) 只限用于肛门，不可内服。


使用 1/2 个栓剂时



沿斜线用割刀
或剪刀截断，按
使用 3 个栓剂
的方法使用。

栓剂的使用方法

为使药剂不被排出，应尽量于排便后使用。



从尖端处开启。



插入到肛门深处。仰卧易于插入。插入不易时，用橄榄油或水涂抹尖端处，以助润滑。为使栓剂不被排出，务必用手指推抵数十秒时间。


发热时的注意事项

- 汗水浸湿的衣服应尽早更换。
- 发热出汗会流失水分。水分应充分补给。
- 发热而畏寒时，应使身体温暖。
- 使用冰枕等使头部降温，会感到舒适。但不致于解热。如被嫌弃，不必强制降温。

贮藏注意事项

- (1) 避开直射日光，置 30 °C 以下阴凉处 (冰箱等)，按右图所示将栓剂尖端向下，竖立保管。
- (2) 保管于儿童无法触及之处。
- (3) 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。

外盒正面



上



下

关于本制品的咨询，请向购买店或下记地址联系

顾客咨询室 樋屋制药株式会社 电话：072-871-2990

邮编 574-0014 大阪府大东市寺川 3-3-63 接待时间 9:00~17:30 (节假日除外)



生产商

樋屋奇应丸株式会社

邮编 530-0043 大阪府北区天满 1-4-11

制药经销单位

樋屋制药株式会社大阪工厂

邮编 574-0014 大阪府大东市寺川 3-3-63