

Papinar in

2013年12月修正 耳科治疗药

帕皮纳林

第二类医药品

使用前请阅读本说明书并保管好，
以便需要时查阅。

第二类医药品

【功能 主治】

耳漏、耳痛、耳痒、外耳炎、耳鸣、中耳炎

【用法 用量】

一次滴1~3滴于耳内，或将纯棉(脱脂棉)做小球，沾润药液后插入耳内。

【使用方法】

1. 采取点滴时 将耳朝上横卧，用吸球管吸入药液，紧贴耳朵入口处耳壁，一次滴1~3滴。
2. 使用纯棉(脱脂棉)时 将纯棉(脱脂棉)做成小豆大圆球，粘润药液，用镊子插入耳朵入口处。待棉花干燥后取出。
3. 儿童使用时，将棉棒上纯棉(脱脂棉)卷小，粘润药液在耳朵入口处轻轻擦涂。
※按一日1~2次使用

【关于用法用量的注意事项】

务必严守规定的用法和用量。

- (1) 儿童使用时，应在监护人指导监督下使用。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，须接受眼科医生诊疗。
- (3) 仅限用于耳部。
- (4) 使用前应充分摇动。
- (5) 使用时，如药液温度低，恐引起眩晕，应尽量接近体温再使用。

制药销售



原泽制药工业株式会社

东京都港区高轮3丁目19番17号

【成份】100克当中

有效成份	苯酚	2.00克
	氨基苯甲酸乙酯	0.30克
	盐酸普鲁卡因	0.30克
	乳酸依沙吡啶	0.10克
	甲磺灭脓	0.10克
添加物	石蜡油、橄榄油、蓖麻子油、L-薄荷醇	

【保管注意事项】

- (1) 避开直射日光，置阴凉处密封保存。
- (2) 保管于儿童无法触及之处。
- (3) 为避免误食，保持品质，请勿换装其他容器。
- (4) 请勿使用过期制品。

关于本制品的咨询，请向购买处药店或下记地址联系

原泽制药工业株式会社 顾客咨询室

电话(03)3441-5191

接待时间 9:30~17:00(节假日除外)

TS1M3Z④

耳科治疗药 帕皮纳林

帕皮纳林，通过氨基苯甲酸乙酯、盐酸普鲁卡因的止痛作用，和苯酚、乳酸依沙吡啶及甲磺灭脓的杀菌作用等，对耳鸣、耳漏、耳痒、耳痛、外耳炎、中耳炎发挥疗效。



禁用事项

(不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易产生副作用)

1. 不可长时期连续使用。
2. 仅限点滴耳朵，不可用于眼和鼻部。



征求咨询

1. 以下情况者服用前，应向医师、药剂师或注册经销商咨询。
(1) 接受医师治疗者。
(2) 对药品等有过敏(如发疹、发红、



注意事项

- (发痒等)史者。
(3) 鼓膜破裂者。
(4) 患部化脓者
2. 使用后，有以下情况者，可能出现副作用，应立即停止使用并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

相关部位	症状
耳	化脓、发肿、刺激感
皮肤	发疹、发红、发痒

3. 使用5~6日，症状仍无改善者，应持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。