

外伤用软膏

[杀菌消毒药]

第 2 类 医 药 品

特福美®A

日常生活中, 因一时疏忽而意外擦伤、切创、烧伤烫伤等情况很多。

特福美 A 软膏除用于伤口杀菌消毒外, 对皴裂和皮肤皴裂也有疗效, 宜作为家庭常备药备用。



使用注意



进行谘询

1. 有以下情况者, 请在使用前向医师、药师或注册销售单位谘询。
(1) 正接受医师治疗者。
(2) 对药品有过过敏症者。
(3) 患部面积大者。
(4) 伤口较深的或烧伤烫伤严重者。
2. 使用后, 如出现如下症状, 可能发生副作用, 请立即停止使用并持本说明书向药师或注册销售单位谘询。

| 相关部位 | 症状 |
|------|----------|
| 皮肤 | 发疹、发红、发痒 |

3. 使用 5~6 天症状仍无缓解的, 应立即停止使用并持本说明书向医师、药师或注册销售单位谘询。

功能 主治

皮肤的杀菌消毒、烧伤烫伤、擦伤、切创、刺创、皴裂或皮肤皴裂、冻疮

用法 用量

1 日 1~2 次, 将软膏适量涂敷或擦入患处

[用法用量的注意事项]

- (1) 儿童使用时, 应在监护人指导监督下使用。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛, 应立即用清水或温水洗净。严重者, 须接受眼科医生诊疗。
- (3) 仅限外用, 禁止内服。

使用时的建议

●用于皮肤杀菌消毒

将患处清洗干净, 轻轻将特福美 A 擦入患处, 或厚厚地涂抹在纱布上后, 再敷用于患处。伤口处的血液、分泌物、脓可吸附于纱布, 使特福美 A 更有疗效。

●用于烧伤烫伤

越早医治疗效越好。将患部用凉水充分冷却, 即使有水疱, 也可将特福美 A 厚厚地涂抹在纱布上后, 大面积敷用于患处。



(背面继续)

●用于擦伤、切创、刺创

去除较大的异物后，将特福美 A 厚厚地涂抹在纱布上后敷用，并缠好绷带。1 日 1 次更换即可。

●用于皴裂或皮肤皴裂

皮肤粗糙，由表皮脂肪及水分不足和新陈代谢低下引起，需将患部用温水清洗并擦拭干净后，用特福美 A 擦入患处并做按摩。特别在睡前和洗涤等带水作业后，请勿忘记使用。

●用于冻疮

表皮无缺损，有肿胀瘙痒时，须勤快地用特福美擦入患处并做按摩。

●患部溃烂时，将特福美 A 厚厚地涂抹在纱布上后，敷用于患处。

●指头处等的小创伤，在使用创口贴前，涂抹少量特福美 A，可防止病菌侵入并防水，有利于带水作业。



成份及作用


100 克当中含以下成份

| 成分 | 含量 | 作用 |
|-------|------|---|
| 氧化锌 | 8g | 与皮肤蛋白质结合形成隔膜，具有收敛、消炎、保护和轻微的防腐作用，可使伤口干燥。 |
| 消旋樟脑 | 0.5g | 促进皮肤血流，消炎，抑制瘙痒。 |
| 盐酸氯己定 | 0.2g | 防止细菌感染和伤口恶化。 |

添加物有精制羊毛脂、凡士林、甘油、蜂蜡、乙醇、三氧化二铁。

贮藏注意事项

- (1) 保管于儿童无法触及之处。
- (2) 避开直射日光，置阴凉处密封保存。
软管药品，须将管口处溢出的特福美 A 擦拭掉，将盖子拧紧。
塑料容器（钵型容器）的药品，须将开口处附着的特福美 A 擦拭掉，将盖子拧紧放置于水平处勿倾斜。
- (3) 为避免误食，保持品质，请勿换装其他容器。
- (4) 请勿使用过期制品。



副作用受害救济制度 ☎ 10120-149-931

联系
信息



制药销售单位
三宝製薬株式会社
东京都新宿区下落和 2-3-18