

2017年9月改订（自主改定）

男性激素软膏剂

第一类医药品

托诺斯® 男性激素制剂

使用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

本制剂是以局部麻醉剂（氨基苯甲酸乙酯、盐酸普鲁卡因、盐酸地布卡因）和男性激素中的睾酮作为有效成分而配制的药品。

将本制剂擦入龟头冠部，在局部麻醉剂作用下，有减缓射精的效果。男性激素是促成“男子汉气概”的物质，通过擦入皮肤柔软部位（如阴囊部位）被人体吸收，进而改善因老化，激素分泌不足而引起的精力减退、勃起力减弱、遗精、男子更年期障碍。



注意事项

⊗ 禁用事项

（不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易发生副作用）

- 有以下情况者请勿使用
 - 对本药剂成份有过敏症史者。
 - 使用前，从软管挤出5毫米药剂，擦涂于大腿内侧皮肤浅薄处，翌日有药疹，发红，瘙痒，皮疹，红肿者。
 - 患有或怀疑患有男性激素依存性肿瘤（例如前列腺肿瘤，乳腺肿（恶性））者。
 - 女性。
 - 小儿（未满15岁）
 - 排尿困难的前列腺肥大患者。
 - 前列腺检查结果，前列腺特异抗原（PSA）值为2.0ng/mL以上者（遵从医师判断）。

※本制剂的有效成分睾酮可能助长前列腺肿瘤。

 - 特别对50岁以上男性，因罹患前列腺肿瘤比率较高，使用本药剂前需接受前列腺检查。
 - 长期使用者须定期接受检查。
 - 检查结果异常者，应立即停用本药剂，向医师或药师咨询。
- 睡眠呼吸暂停综合征者
- 以下部位请勿使用
 - 眼及眼部周围、粘膜（口腔、鼻孔等）。
 - 阴茎前端（尿道口）。
 - 外伤、炎症、湿疹、溃烂、化脓等部位。
- 使用本制剂期间，不能使用以下药品

含有男性激素的医药品。
- 除本人使用外，不要黏附于他人
 - 使用后用肥皂和温水将手洗净。
 - 注意除本人使用外，不要黏附于他人。如有附着应立即用水冲洗。
 - 涂抹部位可能与他人触碰的，应将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。



征求咨询

- 有以下情况者，使用前向医师或药师咨询。
 - 接受医师治疗者。
 - 前列腺肥大，但无排尿困难者。
 - 对药品及化妆品等有过敏症（发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱等）史者。
 - 本人或家族为过敏体质者。
 - 严重的心脏病、肾脏病、肝病、高血压患者或有既往病史者。
- 使用后，出现以下症状者，可能发生副作用，应立即停止使用并持本说明书向医师或药师咨询。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、红肿、水疱、脓疱

- 使用一个月左右症状无改善者，应立即停止使用并持本说明书向医师或药师咨询。
- 未按规定使用药剂者，应立即停止使用并持本说明书向医师或药师咨询。

请续读背面。

■ 功能主治 ■

男性更年期障碍、男性性神经衰弱症状（早泄、勃起力减弱、性功能障碍、精力衰退、遗精、无睾症、梦精等）。

【用语解说】

〔男性更年期障碍〕指因男性激素减少引起的各种症状。

〔男性性神经衰弱症状〕其中的“勃起力减弱”即勃起机能衰退；“性功能障碍”指男性生殖器的机能障碍；“遗精”指没有充分勃起而射精。

■ 用法用量 ■

男子更年期障碍，需在患处或皮肤柔软处以每日一次0.1克（小豆大）充分擦涂，症状好转后改为隔日或每周2次使用。


男性性神经衰弱症状（早泄、勃起力减弱等）需直接涂擦于性器处。

〔注意〕

- （1）严守规定的用法和用量。
- （2）切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，须接受眼科医生诊疗。
- （3）使用前，请将手指洗净。
- （4）将涂抹部位清洁后使用。
- （5）仅限于外用。

■ 详细用法（推荐） ■

	延迟早泄等射精时间	改善勃起力减弱、精力减退等症状
从软管挤出手指的长度	5毫米/次（参照右图）	
用法	性交前20~30分钟擦涂	1日1次
涂敷部位	龟头部（龟头冠）	阴囊部（睾丸）
注意事项	涂抹时要充分擦入皮肤。感到麻痹时用肥皂等清洗掉。尽量少量使用（少有发生因疗效过强而造成勃起力低下的情况。）	涂抹时所有部位都要充分擦入皮肤。如有改善，涂抹次数应减少为隔日或每周2次程度。



■ 成 份 ■

100g 当中含以下有效成份

有效成份	100 克当中	内容
睾酮	1 克	男性激素
氨基苯甲酸乙酯	10 克	局部麻醉剂
盐酸普鲁卡因	0.5 克	局部麻醉剂
盐酸地布卡因	1 克	局部麻醉剂
盐酸苯海拉明	0.5 克	抗组胺剂

添加物中含有白凡士林。

■ 贮藏注意事项 ■

1. 避开直射日光，置于冰箱等阴凉干燥处（15℃以下）密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿使用过期制品。
5. 过多挤出本药剂时，不要收回到软管。

■ 其 他 ■


本制剂因记载法定说明所需，使用大于内容量的容器。因而，容器内留有间隙。为维护品质封装氮气充填并对内容量严格管理。

— 联系方式 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 0120-246-717

接待时间 10:00~12:00、13:00~16:00
(周六、周日、法定节假日及本公司停业日除外)

制药销售单位  大东制药工业株式会社
山梨县甲府市川田町字正里 624 番地 2 (ALIA207)

请续读背面。